

Twinner

Twinner er sorten, der er oplagt som den tidlige sort i økologien såvel som konventionelt pga. den supergode skimmelresistens. Af en tidlig sort at være har Twinner samtidig en rigtig god smag, flot gult kød og gode koge egenskaber.



Knoldbeskrivelse

Anvendelse	Tidlig spise og økologi
Form	Oval
Skindfarve	Gul
Kødfarve	Gul
Størrelse	Mellem
Antal	Middel – lavt knoldantal

Resistens

Virus	God
Nematoder	RO 1,4
Skurv	Middel
Top - skimmel	Resistent
Knold - skimmel	Resistent
Rust	God

Vigtigt

Twinner skal forspires godt, hvis den skal bruges som tidlig sort.

Pga. den gode spisekvalitet kan Twinner både bruges som tidlig og længere hen på sæsonen.

Twinner har en helt unik skimmelresistens, både i top og knolde.

Generelt

Twinner er en meget tidlig sort, som adskiller sig fra andre tidlige ved at være aflang, meget gulkødet og yderst velsmagende. Det betyder også, at anvendelsen er længere end andre tidlige – den kan bruges i hele sommer- og efterårsperioden.

Gødskning

Gødningsniveauet er ca 70 – 80 kg N/ha hvis den skal bruges som tidlig. Skal den bruges til alm. spise skal den ligge ca. 20 % over standardtildelingen i N. P og K er som standard.

Sygdomme

Twinner's resistens er generelt gode. Den er helt i særklasse når det gælder skimmel. Resistensen mht. virus er god, medens resistensen overfor skurv og rust er middel.

Forspiring

Twinner har en middel spirehvide og er derfor ret nem at have med at gøre under forspiring

Plantetal

Twinner sætter ikke voldsomt mange knolde af og hvor mange man sætter, afhænger meget af anvendelsen. Som tidlig vælger man typisk de 50.000 planter/ha (ca. 25 cm) og senere ca. 60.000 for at få så jævn en sortering som muligt.

For yderlig information kontakt:

Niels Jørgen Kristensen - Mobil: 40156233- E-mail: [njc@akv.dk](mailto:njk@akv.dk)

AKV Langholt AmbA

Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov

www.akv.dk